





## واکسیناسیون نقشی شگرف در سلامت جامعه دارد

واکسیناسیون یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که پدر و مادر برای سلامتی کودک خود انجام می‌دهند.

بیماری‌های عفونی خطرناک، دلیل فوت بسیاری از نوزادان و کودکان خردسال هستند. این در حالی است که به آسانی، با واکسیناسیون کودکان، می‌توانیم از ابتلای آن‌ها به این بیماری‌ها جلوگیری کنیم و آن‌ها را برای همیشه ایمن نماییم. در حال حاضر واکسیناسیون از مرگ سه میلیون کودک در سال، در جهان جلوگیری می‌کند.

### چه زمانی و در کجا واکسن بزنیم؟

کودکان در سن‌های مختلف بر اساس یک برنامه زمان‌بندی منظم به واکسن‌های مختلف نیاز دارند.

در کشور ما، واکسیناسیون از زمان تولد نوزاد در زایشگاه یا بیمارستان شروع می‌شود. در تمام مناطق شهری و روستایی کشور ما، همه مراکز خدمات جامع سلامت، پاییگاه‌ها و خانه‌های بهداشت، واکسیناسیون کودکان را بصورت رایگان انجام می‌دهند.

در این مراکز یک «دفترچه پایش مراقبت کودک» به والدین داده می‌شود که اطلاعات مهمی در مورد سابقه واکسیناسیون و نحوه رشد کودک در آن نوشته می‌شود و لازم است به دقت از آن نگه‌داری شود و در هر نوبت مراجعه به مرکز خدمات جامع سلامت، پاییگاه‌ها یا خانه‌های بهداشت، والدین آن را به همراه داشته باشند.



### روتاویروس چه میکروبی است؟

شایع‌ترین علت بیماری‌های اسهالی در میان نوزادان و خردسالان است، اما بزرگسالان را نیز به ندرت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

### چرا عفونت با روتاویروس یک مسئله سلامت عمومی است؟

روتاویروس عامل عفونت دستگاه گوارش است و یکی از رایج‌ترین علل اسهال در نوزادان و خردسالان در جهان به حساب می‌آید. علائم ابتلای به روتاویروس در کودکان معمولاً شدیدتر از بزرگسالان است. علاوه بر اسهال شدید، این ویروس باعث التهاب معده و روده شده و با استفراغ، تب، درد در ناحیه شکم همراه است که می‌تواند منجر به کم شدن آب بدن گردد.

### علائم و نشانه‌های بیماری اسهالی ناشی از روتاویروس چیست؟

علائم معمولاً حدود دو روز پس از قرار گرفتن فرد در معرض روتاویروس شروع می‌شود. استفراغ و اسهال آبکی می‌تواند سه تا هشت روز طول بکشد. علائم دیگر شامل ازدست دادن اشتها و کم آبی بدن (از دست دادن مایعات بدن) می‌باشد که می‌تواند به ویژه برای شیرخواران و کودکان خردسال خطرناک باشد.

### علائم کم آبی بدن عبارتند از:

- کاهش ادرار، خشکی دهان و گلو، گریه با اشک کم یا بدون اشک، گودرفتن چشم‌ها، خواب آلودگی یا گیجی غیرمعمول
- علائم شایعی که کودکان حین ابتلای به بیماری تجربه می‌کنند:



استفراغ، اسهال خفیف تا شدید، خستگی شدید، تب بالا، کج خلفی، کم شدن آب بدن، درد شکم

## جدول واکسیناسیون کشور ایران در سال ۱۴۰۰

سن کودک	نوع واکسن
بدو تولد	هپاتیت ب، فلچ اطفال خوراکی، بث ثر
۲ ماهگی	فلچ اطفال خوراکی، پنج گانه (سه گانه + هپاتیت ب + هموفیلوس آنفلوانزا)، پنوموکوک، روتا ویروس
۴ ماهگی	فلچ اطفال خوراکی، فلچ اطفال تزریقی، پنج گانه، پنوموکوک، روتا ویروس
۶ ماهگی	فلچ اطفال خوراکی، فلچ اطفال تزریقی، پنج گانه، روتا ویروس
۱۲ ماهگی	واکسن سرخک، سرخجه، اوریون (MMR)، پنوموکوک
۱۸ ماهگی	فلچ اطفال خوراکی، MMR، سه گانه (دیفتتری، کجاز، سیاه سرفه)
۶ سال	فلچ اطفال خوراکی، سه گانه

### توصیه‌های معمول بعد از دریافت واکسن روتا ویروس چیست؟

پس از واکسیناسیون، تب مختصر، بی‌قراری و با احتمال کمتر کاهش اشتها، بی‌حالی، تهوع، اسهال رخ می‌دهد، هرچند در مطالعات انجام شده تاکنون، شدت این عوارض خفیف تا متوسط می‌باشد.

در صورت بروز تب، درد یا بی‌قراری، با کارکنان بهداشتی در مرکز جامع سامت، پاییگاه یا خانه بهداشت مشورت کنید.

### واکسن روتا ویروس به چه شکلی در دسترس است؟

واکسن روتا ویروس که در برنامه جاری ایمن سازی کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد باتابم تجارتی روتا سیل و دارای تاییدیه سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و داروی ایران است.

این واکسن در حال حاضر در بسیاری کشورها برای واکسیناسیون کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد و به شکل خوراکی تجویز می‌شود.

### عفونت روتا ویروس چگونه گسترش می‌یابد؟

روتا ویروس از دو روز پیش از ظهور علائم در مدفعه فرد بیمار یافت می‌شود و از طریق مسیر مدفعه‌ی -دهانی و تماس نزدیک بین افراد منتقل می‌شود. بیماری از طریق فرد بیمار، ناقل سالم (فردی که آلوده به میکروب است اما علائم بیماری ندارد) و همچنین اشیاء آلوده شده با ترشحات بدن قابل انتشار است. این ویروس می‌تواند روی سطوحی که ضد عفونی نشده‌اند، برای هفت‌ها یا ماه‌ها زنده بماند.



### چه کسی بیشتر در معرض ابتلاء عفونت روتا ویروس است؟

کودکان بیشتر در معرض خطر ابتلاء به بیماری روتا ویروس هستند. بیماری روتا ویروس عمده‌تر در بین کودکان ۳ ماهه تا ۳ ساله واکسینه نشده رخ می‌دهد. برخی از بزرگسالان نیز در معرض خطر بیشتری برای ابتلاء روتا ویروس هستند، از جمله: افراد مسن و افرادی که نقص سیستم ایمنی دارند.



### چند نوبت واکسن روتا ویروس و در چه سنی تجویز می‌شود؟

سه نوبت و به صورت خوراکی باید دریافت شود. نوبت اول در ۲ ماهگی و دومین و سومین نوبت آن به ترتیب در ۴ و ۶ ماهگی تجویز می‌شود.

## برخی باورهای نادرست در مورد واکسیناسیون

- هیچ یک از نگرانی‌های زیر، دلیل درستی برای واکسن نزدن یا به تعویق انداختن آن نیست:
- مواجهه اخیر با یک بیماری عفونی
- بیماری خفیف با تب مختصر مانند سرماخوردگی، عفونت گوش و اسهال خفیف
- بودن در دوره نقاوت یک بیماری دریافت آتی بیوتیک یا داروهای ضد ویروس
- نارس بودن شیرخوار یا وزن کم هنگام تولد
- تماس خانگی با خانم باردار
- سابقه حساسیت خفیف در دریافت کننده واکسن یا بستگان وی
- تغذیه با شیر مادر
- سوء تغذیه
- ابتلا به زردی دوره نوزادی
- سابقه سندروم مرگ ناگهانی شیرخوار در خانواده
- تماس خانگی با فرد چارنقوص ایمنی
- سابقه جراحی اخیر یا جراحی در آینده نزدیک
- بیماری‌های مزمун غیر واگیر قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی و متابولیک (مانند دیابت)
- بیماری‌ها و شرایط پایدار و غیر پیش‌رونده عصبی مانند سندروم داون و فلج مغزی
- سابقه تشنج در خانواده
- سابقه خانوادگی پیامد نامطلوب ایمن‌سازی
- دریافت اخیر فرازوردهای خونی یا گاماگلوبولین

## آیا دلایلی برای منع مصرف واکسن روتا ویروس وجود دارد؟

▪ اگر چه واکنش شدید/خطرباک بعد از دریافت واکسن‌های روتا ویروس بسیار نادرست، چنانچه یک کودک در نوبت‌های قبلی دچار واکنش حساسیتی شدید شده باشد، نباید نوبت‌های بعدی همان واکسن را دریافت کند.

▪ شیرخواران با سابقه ناهنجاری‌های روده‌ای بد و تولد درمان نشده یا سابقه پیچ خودگیر روده، و نقص ایمنی ترکیبی شدید نباید واکسن روتا ویروس دریافت کنند.

▪ کودکان با سایر بیماری‌های نقص سیستم ایمنی بعد از مشاوره و دریافت نظر پزشک معالج می‌توانند واکسن روتا ویروس را دریافت کنند.

▪ عفونت حاد یا بیماری تبدیل شدید ممکن است دلیلی برای به تعویق انداختن تجویز واکسن با نظر پزشک باشد.

▪ بیماری خفیف مانند عفونت دستگاه تنفسی فوقانی یا اسهال خفیف منع مصرف ندارد.



**همیشه واکسن نزدن و یا به تعویق انداختن بدون دلیل آن اشتباه است.**